

Pour lutter contre sa prolifération

- Il faut éviter les zones d'eau stagnante au jardin :
- Supprimer tous les réceptacles d'eau au jardin
 - vider les soucoupes des pots de fleurs
 - Couvrir les réserves d'eau
 - Vider la gamelle du chien

Il faut vider une fois par semaine tous les réceptacles qui peuvent contenir de l'eau stagnante.

Un simple bouchon de bouteille suffit !!!!



Attention aux gîtes larvaires



-Mettre une moustiquaire sur les réserves d'eau



Dans certaine condition , il peut être vecteur de maladies vectorielles .



- Quelques chiffres
- Dans le monde :
- 3500 espèces de moustiques
 - 105 en Europe
 - 67 espèces de moustiques en France.

Environnement/Cadre de vie
 MAIRIE D'AUCH
 Tél : 05 62 61 66 73

Luttons ensemble contre son installation ...



Le moustique tigre :Aedes albopictus

Adaptons les bons gestes pour lutter contre sa prolifération !!

Quelques critères pour l'identifier

Il est Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est.
En Europe, il s'est développé grâce aux axes auto-routiers , gares, aéroports , frets...
Il se développe préférentiellement dans des environnements péri-urbains.

En 2015 : 30 départements
En 2018 : 42 Départements
En 2021 : 64 Départements



C'est la 10 ième espèce au monde la plus invasive.

Pourquoi ?

- Cycle de vie : 1 mois
- Ponte environ 300 Œufs par femelle
- Eclosion des œufs : Après trois ou quatre jours, les œufs arrivent à maturation et éclosent
- Les œufs sont résistants à la dessiccation (sécheresse) pendant plusieurs mois et à des températures négatives . Cette capacité hibernation lui permet de survivre durant l'hiver sous forme d'œufs en dormance .

- La femelle lors de la ponte, pond majoritairement ses œufs à l'ombre, sur un support sec et foncé . Elle a pour habitude de les disperser à plusieurs endroits ...C'est ce que l'on appelle l'oviposition.

Source: Thèse soutenue par Léa BECHINI
FACULTE DE PHARMACIE DE MARSEILLE



Il mesure entre 3 et 5 mm de la tête à l'abdomen

Son comportement :

- Diurne
- Discret, furtif, son vol est assez bas (au niveau des genoux et vole dans un périmètre limité à quelques dizaines de mètres autour de son lieu de naissance)